

Полисорб МП - дозировка и способ применения

Во-первых, Полисорб всегда принимается в виде водной суспензии, то есть порошок смешивается с 1/4 – 1/2 стакана воды, и никогда не принимается сухим внутрь.

Во-вторых, количество порошка для приема зависит от массы тела, то есть нужно знать примерный вес взрослого или ребенка, который будет его пить. Передозировки быть не может, что снимает опасения при определении дозы. *Таблица подсчета суточной дозы Полисорба МП в зависимости от массы тела пациента:*

Вес пациента	Дозировка	Объем воды
до 10 кг	0,5-1,5 чайные ложки в сутки	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка «без горки» на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием	100 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием	100-150 мл

1 чайная ложка Полисорба МП «с горкой» содержит 1 грамм препарата.

1 грамм — наиболее рекомендуемая разовая детская дозировка.

1 столовая ложка Полисорба МП «с горкой» содержит 2,5-3 грамма препарата.

3 грамма — средняя разовая взрослая дозировка.

Способ применения Полисорб МП при основных показаниях

Заболевание	Способ применения	Особенности приема	Кол-во приемов	Длительность
Пищевая аллергия	Растворить порошок в возрастной дозе в 1/4-1/2стакане воды	Пить перед едой	3 раза в день	3-5 дней
Хроническая аллергия, крапивница, поллиноз, атопия	Растворить порошок в возрастной дозе в 1/4-1/2стакане воды	Пить перед едой	3 раза в день	10-14 дней
Отравление	Промывание желудка с 0,5-1%	Далее – прием внутрь	3раза в день	3-5 дней

	раствором полисорб МП(2-4столовые ложки на 1 литр воды)	взвеси полисорб а МП в возрастн о й дозе		
	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼- 1/2стакане воды: 1 сутки – принимать через каждый час.			
Кишечные инфекции	2 сутки – четыре раза в сутки по дозе.	Прием в составе комплекс ного лечения	3-4 раза в день	5-7 дней
	С первых дней болезни Растворить порошок в возрастной дозе в ¼- 1/2стакане воды	Прием в составе комплекс ного лечения	3-4 раза в день	7-10 дней
Вирусный гепатит	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼- 1/2стакане воды	За час до еды или через час после еды	3 раза в день	7-14 дней
Очищение организма	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼- 1/2стакане воды	Прием в составе комплекс ного лечения	3-4 раза в день	25-30 дней
Хроническая почечная недостаточность	Растворить порошок в возрастной дозе в ¼- 1/2стакане воды	За час до еды или через час после еды	3 раза в день	10-14 дней
Токсикоз беременных				

Похмелье	<p>1 сутки – принимать 5 раз в день через час. 2 сутки – принимать 4 раза в день через час.</p>	<p>Пить больше жидкости</p>	<p>1 сутки – 5 раз. 2 сутки – 4 раза.</p>	2 дня
Профилактика похмелья	<p>Принять по 1 дозе: до застолья, перед сном после застолья, наутро.</p>		<p>1 раз в день</p>	3 дня